




伊克定[®] 膠囊500毫克(賜福力欣)
Ikodin[®] Capsules 500mg(Cephalexin)

【成份】

Cephalexin monohydrate eq. to cephalexin..... 500mg(potency)

Cephalexin monohydrate為一種口服半合成性頭芽孢菌素(Cephalosporin) 抗生素，其化學結構式為7-(D- α -amino- α -phenyl-acetam-ido-3-methyl-3-cephem-4-carboxylic acid monohydrate.



【賦形劑】

Aerosil、Avicel、Magnesium Stearate

【膠囊成份】

Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Brilliant Blue FCF、Tartrazine

【藥理作用】

口服吸收極為完全而迅速，服用後 1 小時即可得最高血中濃度，而 6 小時後仍可測得血中濃度，並且 90%以上不受破壞而由尿中排出是故不會蓄積體內。其於酸中甚為安定，服用時不需考慮進餐與否。對革蘭氏陽性及陰性皆呈現殺菌性，其作用機序乃為抑制細菌細胞壁的合成。其對有感受性的葡萄球菌（包括凝固酶陽性及陰性者，及對 pen-icillin 有感受性及抗藥性的菌株）所導致的皮膚及軟組織的感染。一種或數種有感受性的大腸菌，奇異變形桿菌，克雷白氏桿菌所導致的泌尿道感染。及鏈球菌所致的呼吸道感染皆顯示極佳的效果。

【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

口服。成人 1 日 1~4 gm 分次服用，通常每 6 小時服 250 mg，嚴重感

染及由感受性較低細菌所引起之感染每 6 小時 500 mg~1 gm，兒童依照體重每公斤每日 25~50 mg 分四次服用，嚴重感染時量可加倍。

【注意事項】

1. 服用本藥後曾發生過敏者對 penicillin 會生過敏者，服用本劑須小心，倘使用後發生過敏，如：紅疹、蕁麻疹時即停止用藥，即可自動消退。
2. 腎功能有顯著損傷之患者服用本劑須謹慎之。
3. 用於外科手術時應與抗生素療法合併施行。
4. 本劑對孕婦的安全性尚未確定。

【包裝】

4-1000 粒罐裝、瓶裝、盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號